Red Española de Registros de Cáncer

REDECAN

ESTIMACIONES DE LA INCIDENCIA DEL CÁNCER EN ESPAÑA, 2026

Enero 2026

Referencia aconsejada:

Estimaciones de la incidencia del cáncer en España, 2026.
Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), 2026.

REDECAN es la Red Española de Registros de Cáncer compuesta por los registros poblacionales de cáncer de Asturias, Canarias, Castellón, Castilla y León, Euskadi, Girona, Granada, La Rioja, Mallorca, Murcia, Navarra y Tarragona, por el Registro poblacional de Tumores Infantiles de la Comunitat Valenciana, por el Registro poblacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid y por el Registro Español de Tumores Infantiles. Para la obtención de las estimaciones de la incidencia del cáncer en España del año 2026 se han utilizado datos de incidencia de todos los registros poblacionales globales consolidados de REDECAN que cubren todas las edades (Asturias, Canarias –islas de Gran Canaria y Tenerife–, Castellón, Castilla y León –provincia de Salamanca–, Euskadi, Girona, Granada, La Rioja, Mallorca -isla-, Murcia, Navarra y Tarragona).

Situación actual del cáncer en España

En la actualidad y desde hace ya muchos años, el cáncer es uno de los grupos de enfermedades de mayor importancia en salud pública en España. En la población general, el cáncer es la primera causa de muerte seguida por las enfermedades del sistema circulatorio. En 2024, un 26,5% de todas las defunciones fueron a causa del cáncer. En los hombres, con un 30,8%, es la primera causa de muerte y en las mujeres representan un 22,1% del total de defunciones este mismo año. Las tendencias de la incidencia por cáncer son distintas según el tipo de cáncer. Por ejemplo, mientras la incidencia del cáncer de páncreas aumenta en ambos sexos, la de cavidad oral, faringe y pulmón aumenta en las mujeres y disminuye en los hombres, y la de estómago disminuye en ambos sexos. De la misma manera, las tendencias de la mortalidad muestran evoluciones distintas. Por ejemplo, mientras la incidencia del cáncer de mama femenino ha aumentado, su mortalidad ha disminuido. El análisis detallado de las tendencias de la incidencia y mortalidad muestra el grado de efectividad tanto de las políticas de prevención primaria y secundaria, como de las mejoras terapéuticas.

El objetivo de este informe es describir la situación actual de la incidencia del cáncer en nuestro país, utilizando los datos de incidencia disponibles en la base de datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN)[1] y los datos de mortalidad proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el año 2023.

Tanto el número de casos de cáncer como las tasas de incidencia son indicadores que muestran la magnitud del cáncer en la población y el riesgo de padecerlo y, por tanto, permiten la monitorización de la epidemia de cáncer. La información que se facilita en el presente informe es de utilidad para definir prioridades en las estrategias y políticas de salud en España con el fin último de contribuir a disminuir la carga de cáncer en la población y las desigualdades entre las diferentes áreas geográficas.

La incidencia de cáncer en una población definida geográficamente se puede conocer gracias a la existencia de registros poblacionales cuyo principal objetivo es identificar y contabilizar todos los casos incidentes (nuevos casos) que se diagnostican entre las personas residentes en esa área geográfica. Asimismo, estos registros también son imprescindibles para determinar la supervivencia de los pacientes a nivel poblacional y para conocer la prevalencia. También tienen otras muchas finalidades siendo una de ellas la evaluación de los programas de diagnóstico precoz[2].

[1] La base de datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) contiene los datos de 12 registros de cáncer de base poblacional: Asturias, Canarias (islas de Gran Canaria y Tenerife), Castellón, Castilla y León (provincia de Salamanca), Euskadi, Girona, Granada, La Rioja, Mallorca (isla), Murcia, Navarra y Tarragona.

[2] Jensen OM, Parkin DM, MacLennan R, Muir CS and Skeet RG. 1991. Cancer Registration: Principles and Methods. IARC Scientific Publication No. 95.

Consideraciones sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la incidencia del cáncer

La pandemia de COVID-19 afectó de manera significativa al número de diagnósticos de cáncer en muchos países durante el año 2020. España fue en 2020 uno de los países más afectados durante la primera ola de la pandemia. Como consecuencia, el número de pacientes a los que se realizó algún procedimiento relacionado con alguna patología oncológica se redujo en más del 13% y el número de pruebas diagnósticas realizadas sufrió un retroceso importante[3]. A causa de la pandemia de COVID-19 los programas de cribado de cáncer se vieron afectados en mayor o menor grado por lo que, con toda probabilidad, el número de cánceres colorrectales, de mama y de cuello uterino finalmente diagnosticados en 2020 fue menor del esperado. No solo los programas de cribado se vieron afectados. Todo el sistema sanitario se vio tensionado por la pandemia y esto también influyó negativamente en la capacidad diagnóstica del sistema. Otros factores relacionados con la pandemia también pudieron influir en mayor o menor grado como el miedo a entrar en los centros sanitarios, ya fuesen de atención primaria o de atención hospitalaria, o las dificultades en el acceso al sistema sanitario debido al confinamiento. Por todo ello, y aunque no sabemos en qué magnitud, el número real de cánceres diagnosticados en 2020 fue menor al que se había estimado sin la pandemia. Y esto ocurrió tanto en España como a nivel mundial. Así pues, tanto las estimaciones de la incidencia de cáncer para 2020 realizadas por REDECAN para España como las realizadas por la International Agency for Research on Cancer (IARC-OMS) a nivel mundial se distanciaron en mayor o menor grado de las estadísticas de incidencia que finalmente fueron la realidad.

La razón de todo ello es que las estimaciones de incidencia de cáncer se obtienen a partir de proyecciones realizadas con datos de los registros de cáncer de población de años anteriores, y utilizando métodos estadísticos que son válidos si no se producen fenómenos que alteren significativamente la capacidad diagnóstica como lo fue la pandemia de COVID-19.

Así pues, las estimaciones del número absoluto de cánceres incidentes calculadas para el año 2020 fueron con mucha probabilidad sobreestimaciones respecto a la incidencia real. En Estados Unidos, después de la disminución del número de casos incidentes de 2020 se esperaba un rebote en 2021, que no llegó a observarse, siendo el número de casos más de un 10% inferior al valor de 2019. En algunos otros países se observó un fenómeno similar. Por todo ello, todavía no está claro cómo la pandemia afectó al número de diagnósticos de cáncer de los años 2021 a 2025 ni cómo afectará al del año 2026. Sin embargo, es muy probable que el efecto, si lo hubo, fuera prácticamente inexistente en los años 2023 a 2025, y más aún en el año 2026.

Las estimaciones de incidencia que se presentan en este informe deben entenderse también como la incidencia que habría el año 2026 si no hubiera factores que alteren las posibilidades diagnósticas del sistema sanitario.

[3] Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Estudio de Impacto de la Pandemia por COVID-19 sobre la Prevención y el Control del Cáncer en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad.

Tablas y figuras

A partir de los datos de incidencia de las provincias con registros de cáncer de población y los datos de mortalidad de todas las provincias, se ha estimado la incidencia del cáncer en España correspondiente al año 2026. Las tablas 1, 2 y 3 muestran las estimaciones de la incidencia de cáncer en España para el año 2026 por tipo tumoral y sexo presentando el número de casos nuevos anuales, la tasa bruta, la tasa ajustada a la población estándar mundial, la tasa ajustada a la población estándar europea de 1976 y la tasa ajustada a la población estándar europea de 2013, todas ellas por 100.000 habitantes y año. Aunque para la mayoría de tumores se ha utilizado el mismo método de cálculo, en cada tipo tumoral se ha aplicado el método estadístico más conveniente con la finalidad de que cada valor sea lo más preciso posible (ver apartado Metodología estadística). En consecuencia, estas tablas (tablas 1, 2 y 3) también presentan los intervalos de credibilidad o de confianza al 95% según la metodología utilizada en cada tipo tumoral para cada uno de los cinco parámetros presentados. Las figuras 2 a 4 presentan de forma gráfica el número estimado de casos de cada tipo tumoral y sexo ordenados por orden decreciente de magnitud y las figuras 5 a 7 presentan las tasas ajustadas a la población estándar europea de 2013 de cada tipo tumoral ordenadas también por orden decreciente.

A continuación, las tablas 4, 5 y 6 presentan, para cada tipo tumoral, el número de casos nuevos anuales por tres grandes grupos de edad (0-44, 45-64, 65+) así como la tasa específica por edad[4] y la tasa truncada[5] de estos grupos de edad. Las figuras 8, 9 y 10 presentan, de una forma gráfica y también para cada tipo tumoral, el número de casos nuevos anuales por estos mismos tres grandes grupos de edad (0-44, 45-64, 65+).

La Figura 11 presenta la probabilidad (expresada en %) de desarrollar un cáncer en función de la edad y el sexo.

La tabla 7 presenta las tasas estimadas de incidencia de los años 2016 y 2026 por tipo de cáncer y sexo.

La tabla 8 (anexo), presenta los tipos tumorales estudiados y los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª edición utilizados en cada uno de ellos. Como puede observarse en esta tabla, en el cálculo de las estimaciones se han incluido todos los cánceres invasivos excepto en los de la vejiga urinaria para los cuales se han incluido también los tumores in situ y los de comportamiento incierto.

Finalmente, la tabla 9 presenta la pirámide estándar mundial y la tabla 10 las pirámides estándar europeas de 1976 y de 2013, respectivamente.

[4] Una tasa específica por edad es una tasa bruta para el grupo de edad especificado.
[5] Una tasa truncada es una tasa ajustada por edad para el grupo de edad especificado. Para el ajuste, se ha utilizado la nueva pirámide europea estándar de 2013.

Resultados

El número total de casos incidentes estimados para 2026 es de 301.884, de los que 168.764 son en hombres y 133.120 en mujeres. En el conjunto de la población, el tumor más frecuente es el de colon y recto con un total de 44.132 nuevos casos (30.035 de colon y 14.097 de recto). Le siguen el cáncer de mama femenina con 38.318 nuevos casos, el cáncer de pulmón con 34.908 nuevos casos y el de próstata con 34.833 nuevos casos. A más distancia se sitúa el cáncer de vejiga urinaria con 23.929 nuevos casos (tablas 1, 2 y 3 y figuras 2,3 y 4).

Por sexos, los cánceres más frecuentes en los hombres fueron el de próstata (34.833 casos), colon y recto (26.477), pulmón (23.079 casos) y vejiga urinaria (19.496 casos) (Tabla 1 y Figura 2). En las mujeres los más frecuentes fueron el de mama (38.318 casos), colon y recto (17.655 casos), pulmón (11.829 casos) y cuerpo uterino (7.759 casos) (tabla 2 y figura 3).

El número total de casos incidentes estimados para 2026 (301.884) se reparte de manera muy diferente según la edad. Entre los más jóvenes (0-44 años) el número es de 16.432 (5,44%); entre los de mediana edad (45-64 años) es de 102.154 (33,84%) y entre los de edades más avanzadas es de 183.298 (60,72%). En los hombres, estos valores son: 6.174 (3,66%), 51.738 (30,66%) y 110.852 (65,68%). Y entre las mujeres 10.258 (7,71%), 50.415 (37,87%) y 72.446 (54,42%) (tablas 4, 5 y 6, y figuras 8, 9 y 10). Buena parte de esta diferencia es debida a que en las mujeres el cáncer más frecuente, el de mama, se presenta en edades más tempranas de la vida, mientras que el más frecuente en los hombres, el de próstata, se presenta en edades más avanzadas.

Un factor de riesgo fundamental para la aparición de tumores es la edad. El riesgo o probabilidad (en %) de desarrollar un cáncer crece en función de ésta, empezando a aumentar de forma importante a partir de los 45-49 años. Desde el nacimiento hasta los 80 años, los hombres tienen un riesgo de desarrollar cáncer de un 40,2% y las mujeres de un 28,5%. Desde el nacimiento hasta los 85 años, estos valores son de un 47,9% en los hombres y de un 33,3% en las mujeres (Figura 11). Cabe señalar que, en la mayoría de los tumores que afectan a ambos sexos, las mujeres tienen menos riesgo de presentar cáncer que los hombres.

En los 10 últimos años la tasa estimada de incidencia para el conjunto de cánceres excepto los de piel no melanoma ha disminuido en los hombres pasando de 731 a 678 por 100.000 hombres y año y ha aumentado en las mujeres de 419 a 438 por 100.000 mujeres y año. La Tabla 7 muestra la tasa estimada de incidencia de los años 2016 y 2026 por cada tipo de cáncer.

Figura 1. Registros poblacionales de cáncer de España que han aportado datos para el cálculo de las estimaciones de la incidencia del cáncer en España, 2026

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Tabla 1. Proyecciones del número de casos incidentes de cáncer, tasa bruta y tasas ajustadas a las poblaciones estándar mundial, europea y nueva europea por tipo de cáncer en hombres. España, 2026

TIPO TUMORAL	N	IC 95% (N)	TB	IC 95% (TB)	TAm	IC 95% (TAm)	TAe	IC 95% (TAe)	TAne	IC 95% (TAne)
Labio, cavidad oral y faringe	5.270	(4.382 – 6.261)	21,4	(17,8 - 25,4)	10,1	(8,4 - 12,1)	14,6	(12,1 - 17,3)	20,7	(17,2 - 24,6)
Esófago	1.861	(1.623 – 2.126)	7,6	(6,6 - 8,6)	3,5	(3,0 – 4,0)	5,0	(4,4 - 5,8)	7,3	(6,4 - 8,4)
Estómago	4.409	(4.044 – 4.800)	17,9	(16,4 - 19,5)	7,6	(7,0 - 8,3)	11,4	(10,4 - 12,4)	17,8	(16,3 - 19,3)
Colon	17.798	(16.090 – 19.632)	72,3	(65,4 - 79,8)	29,7	(26,8 - 32,7)	44,9	(40,7 - 49,5)	72,1	(65,1 - 79,7)
Recto	8.679	(7.792 – 9.630)	35,3	(31,7 - 39,1)	15,7	(14,1 - 17,4)	23,0	(20,7 - 25,6)	34,5	(31,0 - 38,3)
Colorrectal	26.477	(24.553 – 28.542)	107,6	(99,8 - 116)	45,4	(42,1 - 48,9)	68,0	(63,1 - 73,2)	106,7	(98,8 - 115,1)
Hígado	5.306	(4.681 – 5.985)	21,6	(19,0 - 24,3)	9,9	(8,7 - 11,2)	14,3	(12,6 - 16,2)	20,9	(18,5 - 23,6)
Vesícula biliar	1.246	(998 – 1.532)	5,1	(4,1 - 6,2)	1,9	(1,6 - 2,4)	3,0	(2,4 - 3,7)	5,1	(4,1 - 6,3)
Páncreas	5.258	(4.828 – 5.718)	21,4	(19,6 - 23,2)	9,0	(8,2 - 9,8)	13,5	(12,4 - 14,7)	21,2	(19,4 – 23,0)
Laringe	2.803	(2.416 – 3.228)	11,4	(9,8 - 13,1)	5,4	(4,6 - 6,3)	7,8	(6,7 – 9,0)	10,9	(9,4 - 12,6)
Pulmón	23.079	(21.604 – 24.605)	93,8	(87,8 – 100,0)	39,6	(37,1 - 42,3)	59,5	(55,7 - 63,4)	93,0	(87,0 - 99,3)
Melanoma de piel	4.009	(3.314 – 4.789)	16,3	(13,5 - 19,5)	8,3	(6,9 - 9,9)	11,5	(9,5 - 13,7)	15,9	(13,1 – 19,0)
Próstata	34.833	(28.747 – 41.437)	141,6	(116,8 - 168,4)	61,7	(50,3 - 74,1)	91,4	(75,0 – 109,0)	140,5	(115,8 - 167,2)
Testículo	1.705	(1.554 – 1.869)	6,9	(6,3 - 7,6)	6,9	(6,3 - 7,6)	7,3	(6,7 - 8,1)	7,0	(6,4 - 7,7)
Riñón (sin pelvis)	6.263	(5.319 – 7.309)	25,5	(21,6 - 29,7)	12,4	(10,5 - 14,5)	17,6	(14,9 - 20,5)	24,4	(20,8 - 28,5)
Vejiga urinaria	19.496	(17.141 – 22.008)	79,2	(69,7 - 89,4)	32,6	(28,7 - 36,9)	49,3	(43,4 - 55,6)	79,0	(69,3 - 89,3)
Encéfalo y sistema nervioso	2.512	(2.231 – 2.818)	10,2	(9,1 - 11,5)	5,8	(5,1 - 6,5)	7,6	(6,7 - 8,5)	9,9	(8,8 - 11,2)
Tiroides	1.738	(1.583 – 1.910)	7,1	(6,4 - 7,8)	4,5	(4,1 – 5,0)	5,7	(5,2 - 6,3)	6,7	(6,1 - 7,4)
Linfoma de Hodgkin	1.052	(936 – 1.181)	4,3	(3,8 - 4,8)	3,7	(3,2 - 4,1)	4,0	(3,5 - 4,5)	4,2	(3,7 - 4,7)
Linfomas no hodgkinianos	6.902	(5.957 – 7.946)	28,1	(24,2 - 32,3)	14,6	(12,6 - 16,7)	19,9	(17,2 - 22,9)	27,2	(23,5 - 31,4)
Mieloma	1.874	(1.633 – 2.137)	7,6	(6,6 - 8,7)	3,1	(2,7 - 3,5)	4,7	(4,1 - 5,4)	7,5	(6,6 - 8,6)
Leucemias	3.827	(3.060 – 4.712)	15,6	(12,4 - 19,2)	8,2	(6,7 – 10,0)	10,8	(8,7 - 13,1)	15,7	(12,5 - 19,3)
Otros	8.844	(8.017 – 9.737)	35,9	(32,6 - 39,6)	15,8	(14,4 - 17,4)	23,0	(20,9 - 25,3)	35,8	(32,5 - 39,5)
Todos excepto piel no mel.	**168.764**	**(161.418 – 176.719)**	**685,9**	**(656,1 - 718,3)**	**310,1**	**(296,6 - 324,9)**	**449,7**	**(430,2 - 470,9)**	**677,5**	**(647,7 - 709,7)**

TB: Tasa bruta. **TAm**: Tasa ajustada a la población estándar mundial. **TAe**: Tasa ajustada a la población estándar europea. **TAne**: Tasa ajustada a la nueva población estándar europea. **IC95%**: Intervalo de credibilidad o de confianza al 95%
Todas las tasas están expresadas por 100.000 habitantes y año.

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Tabla 2. Proyecciones del número de casos incidentes de cáncer, tasa bruta y tasas ajustadas a las poblaciones estándar mundial, europea y nueva europea por tipo de cáncer en mujeres. España, 2026.

TIPO TUMORAL	N	IC 95% (N)	TB	IC 95% (TB)	TAm	IC 95% (TAm)	TAe	IC 95% (TAe)	TAne	IC 95% (TAne)
Labio, cavidad oral y faringe	2.933	(2.527 – 3.379)	11,5	(9,9 - 13,2)	4,7	(4,0 - 5,4)	6,8	(5,8 - 7,8)	9,6	(8,3 - 11,1)
Esófago	502	(422 - 591)	2,0	(1,6 - 2,3)	0,7	(0,6 - 0,8)	1,1	(0,9 - 1,2)	1,6	(1,4 - 1,9)
Estómago	3.186	(2.916 – 3.471)	12,4	(11,4 - 13,6)	4,6	(4,2 - 5,1)	6,8	(6,2 - 7,4)	10,3	(9,4 - 11,2)
Colon	12.237	(10.939 – 13.620)	47,8	(42,7 - 53,2)	17,3	(15,5 - 19,3)	25,7	(23,0 - 28,5)	39,6	(35,4 – 44,0)
Recto	5.418	(4.768 – 6.115)	21,2	(18,6 - 23,9)	8,8	(7,7 – 10,0)	12,7	(11,1 - 14,3)	18,0	(15,8 - 20,3)
Colorectal	17.655	(16.203 – 19.204)	69,0	(63,3 – 75,0)	26,2	(24,0 - 28,4)	38,4	(35,3 - 41,6)	57,5	(52,8 - 62,5)
Hígado	1.546	(1.328 – 1.785)	6,0	(5,2 – 7,0)	2,1	(1,8 - 2,5)	3,2	(2,7 - 3,7)	5,0	(4,3 - 5,8)
Vesícula biliar	1.310	(1.052 – 1.615)	5,1	(4,1 - 6,3)	1,5	(1,3 - 1,9)	2,4	(1,9 - 2,9)	4,1	(3,3 – 5,0)
Páncreas	5.147	(4.708 – 5.611)	20,1	(18,4 - 21,9)	6,6	(6,0 - 7,2)	10,1	(9,2 – 11,0)	16,4	(15,0 - 17,8)
Laringe	403	(331 - 483)	1,6	(1,3 - 1,9)	0,8	(0,6 - 0,9)	1,1	(0,9 - 1,3)	1,4	(1,1 - 1,6)
Pulmón	11.829	(10.966 – 12.737)	46,2	(42,8 - 49,7)	19,7	(18,2 - 21,3)	28,3	(26,2 - 30,6)	40,0	(37,1 - 43,2)
Melanoma de piel	4.065	(3.371 – 4.844)	15,9	(13,2 - 18,9)	8,9	(7,4 - 10,7)	11,6	(9,6 - 13,9)	14,2	(11,8 - 16,9)
Mama	38.318	(34.431 – 42.460)	149,7	(134,5 - 165,8)	78,6	(70,2 - 87,6)	105,7	(94,5 - 117,6)	131,5	(118,2 - 145,7)
Cérvix Uterino	2.760	(2.298 – 3.284)	10,8	(9,0 - 12,8)	7,0	(5,8 - 8,4)	8,9	(7,3 - 10,6)	10,0	(8,3 - 11,9)
Cuerpo Uterino	7.759	(6.377 – 9.306)	30,3	(24,9 - 36,3)	13,7	(11,2 - 16,6)	19,4	(15,8 - 23,5)	26,3	(21,6 - 31,5)
Ovario	3.767	(3.293 – 4.288)	14,7	(12,9 - 16,7)	7,2	(6,3 - 8,2)	9,9	(8,6 - 11,3)	12,8	(11,2 - 14,5)
Riñón (sin pelvis)	2.902	(2.328 – 3.556)	11,3	(9,1 - 13,9)	5,0	(4,0 - 6,1)	7,0	(5,6 - 8,6)	9,8	(7,8 – 12,0)
Vejiga urinaria	4.433	(3.750 – 5.185)	17,3	(14,6 - 20,3)	6,7	(5,7 - 7,9)	9,8	(8,3 - 11,5)	14,6	(12,3 - 17,1)
Encéfalo y sistema nervioso	2.161	(1.914 – 2.426)	8,4	(7,5 - 9,5)	4,7	(4,1 - 5,3)	5,8	(5,1 - 6,5)	7,5	(6,6 - 8,4)
Tiroides	4.941	(4.682 – 5.210)	19,3	(18,3 - 20,3)	13,3	(12,6 - 14,1)	16,4	(15,5 - 17,3)	18,2	(17,2 - 19,2)
Linfoma de Hodgkin	739	(648 - 839)	2,9	(2,5 - 3,3)	2,7	(2,4 - 3,1)	2,8	(2,5 - 3,2)	2,9	(2,5 - 3,3)
Linfomas no hodgkinianos	5.299	(4.558 – 6.119)	20,7	(17,8 - 23,9)	9,6	(8,3 - 11,1)	13,2	(11,4 - 15,2)	18,0	(15,5 - 20,7)
Mieloma	1.652	(1.373 – 1.964)	6,5	(5,4 - 7,7)	2,2	(1,8 - 2,7)	3,4	(2,8 – 4,0)	5,3	(4,4 - 6,4)
Leucemias	2.819	(2.204 – 3.537)	11,0	(8,6 - 13,8)	5,5	(4,4 - 6,7)	6,8	(5,5 - 8,4)	9,5	(7,5 - 11,8)
Otros	6.994	(6.286 – 7.747)	27,3	(24,6 - 30,3)	10,8	(9,8 - 11,9)	15,1	(13,7 - 16,7)	22,4	(20,2 - 24,7)
Todos excepto piel no mel.	**133.120**	**(128.243 – 138.372)**	**519,9**	**(500,9 - 540,4)**	**243,1**	**(233,2 - 253,7)**	**333,8**	**(320,6 - 348,1)**	**448,8**	**(432,2 - 466,6)**

TB: Tasa bruta. **TAm**: Tasa ajustada a la población estándar mundial. **TAe**: Tasa ajustada a la población estándar europea. **TAne**: Tasa ajustada a la nueva población estándar europea. **IC95%**: Intervalo de credibilidad o de confianza al 95%
Todas las tasas están expresadas por 100.000 habitantes y año.

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Tabla 3. Proyecciones del número de casos incidentes de cáncer, tasa bruta y tasas ajustadas a las poblaciones estándar mundial, europea y nueva europea por tipo de cáncer. Ambos sexos. España, 2026.

TIPO TUMORAL	N	IC 95% (N)	TB	IC 95% (TB)	TAm	IC 95% (TAm)	TAe	IC 95% (TAe)	TAne	IC 95% (TAne)
Labio, cavidad oral y faringe	8.203	(7.227 – 9.290)	16,3	(14,4 - 18,5)	7,4	(6,5 - 8,4)	10,7	(9,3 - 12,1)	15,2	(13,3 - 17,2)
Esófago	2.363	(2.112 – 2.643)	4,7	(4,2 - 5,3)	2,1	(1,8 - 2,3)	3,0	(2,7 - 3,4)	4,5	(4,0 – 5,0)
Estómago	7.595	(7.141 – 8.079)	15,1	(14,2 - 16,1)	6,1	(5,8 - 6,5)	9,1	(8,5 - 9,7)	14,0	(13,2 – 15,0)
Colon	30.035	(27.890 – 32.332)	59,8	(55,5 - 64,4)	23,5	(21,8 - 25,3)	35,3	(32,8 – 38,0)	55,9	(51,8 - 60,2)
Recto	14.097	(12.997 – 15.276)	28,1	(25,9 - 30,4)	12,3	(11,3 - 13,3)	17,9	(16,4 - 19,4)	26,2	(24,2 - 28,5)
Colorrectal	44.132	(41.721 – 46.713)	87,9	(83,1 – 93,0)	35,8	(33,8 - 37,9)	53,2	(50,3 - 56,2)	82,1	(77,5 – 87,0)
Hígado	6.852	(6.190 – 7.572)	13,6	(12,3 - 15,1)	6,0	(5,4 - 6,7)	8,8	(7,9 - 9,7)	13,0	(11,7 - 14,4)
Vesícula biliar	2.556	(2.198 – 2.974)	5,1	(4,4 - 5,9)	1,7	(1,5 – 2,0)	2,7	(2,3 - 3,1)	4,6	(3,9 - 5,3)
Páncreas	10.405	(9.791 – 11.058)	20,7	(19,5 – 22,0)	7,8	(7,3 - 8,3)	11,8	(11,1 - 12,5)	18,8	(17,6 - 19,9)
Laringe	3.206	(2.812 – 3.638)	6,4	(5,6 - 7,2)	3,1	(2,7 - 3,5)	4,4	(3,9 – 5,0)	6,1	(5,4 – 7,0)
Pulmón	34.908	(33.199 – 36.684)	69,5	(66,1 - 73,1)	29,7	(28,2 - 31,2)	43,9	(41,7 - 46,2)	66,5	(63,2 – 70,0)
Melanoma de piel	8.074	(7.092 – 9.176)	16,1	(14,1 - 18,3)	8,6	(7,6 - 9,8)	11,6	(10,2 - 13,2)	15,1	(13,2 - 17,1)
Riñón (sin pelvis)	9.165	(8.060 – 10.399)	18,3	(16,1 - 20,7)	8,7	(7,6 - 9,9)	12,3	(10,8 – 14,0)	17,1	(15 - 19,4)
Vejiga urinaria	23.929	(21.477 – 26.551)	47,7	(42,8 - 52,9)	19,7	(17,6 - 21,9)	29,5	(26,5 - 32,8)	46,8	(41,8 - 52,1)
Encéfalo y sistema nervioso	4.673	(4.299 – 5.078)	9,3	(8,6 - 10,1)	5,2	(4,8 - 5,7)	6,7	(6,1 - 7,2)	8,7	(8,0 - 9,5)
Tiroides	6.678	(6.377 – 6.998)	13,3	(12,7 - 13,9)	8,9	(8,5 - 9,4)	11,1	(10,6 - 11,6)	12,4	(11,9 – 13,0)
Linfoma de Hodgkin	1.792	(1.644 – 1.954)	3,6	(3,3 - 3,9)	3,2	(2,9 - 3,5)	3,4	(3,1 - 3,7)	3,5	(3,3 - 3,9)
Linfomas no hodgkinianos	12.201	(11.000 – 13.529)	24,3	(21,9 - 26,9)	12,1	(10,9 - 13,4)	16,5	(14,9 - 18,3)	22,6	(20,4 - 25,1)
Mieloma	3.526	(3.157 – 3.934)	7,0	(6,3 - 7,8)	2,7	(2,4 – 3,0)	4,0	(3,6 - 4,5)	6,4	(5,8 - 7,2)
Leucemias	6.646	(5.663 – 7.786)	13,2	(11,3 - 15,5)	6,8	(5,9 - 7,9)	8,8	(7,6 - 10,2)	12,6	(10,7 - 14,8)
Otros	15.838	(14.749 – 17.006)	31,5	(29,4 - 33,9)	13,3	(12,4 - 14,2)	19,1	(17,8 - 20,4)	29,1	(27,1 - 31,3)
Todos excepto piel no mel.	**301.884**	**(293.067 – 311.416)**	**601,3**	**(583,7 - 620,2)**	**276,6**	**(268,2 - 285,7)**	**391,8**	**(380 - 404,5)**	**563,2**	**(546,1 - 581,6)**

TB: Tasa bruta. **TAm**: Tasa ajustada a la población estándar mundial. **TAe**: Tasa ajustada a la población estándar europea. **TAne**: Tasa ajustada a la nueva población estándar europea. **IC95%**: Intervalo de credibilidad o de confianza al 95%

Esta tabla sólo incluye los principales tumores que se presentan en ambos sexos. Por lo tanto no incluye: próstata, testículo, mama, cuello uterino, cuerpo uterino y ovario. Aunque en la mama masculina también se desarrollan y diagnostican cánceres, este tipo de cáncer es muy infrecuente por lo que los cánceres de la mama masculina se incluyen en la categoría "Otros".

Todas las tasas están expresadas por 100.000 habitantes y año.

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 2. Número estimado de casos incidentes de cáncer en España por tipo tumoral, 2026. Hombres



Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 3. Número estimado de casos incidentes de cáncer en España por tipo tumoral, 2026. Mujeres



Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 4. Número estimado de casos incidentes de cáncer en España por tipo tumoral, 2026. Ambos sexos



Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 5. Tasas estimadas de incidencia de cáncer ajustadas por edad a la nueva población estándar europea por tipo tumoral en España, 2026. Hombres



Tasas por 100.000 habitantes y año.

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 6. Tasas estimadas de incidencia de cáncer ajustadas por edad a la nueva población estándar europea por tipo tumoral en España, 2026. Mujeres



Tasas por 100.000 habitantes y año.

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 7. Tasas estimadas de incidencia de cáncer ajustadas por edad a la nueva población estándar europea por tipo tumoral en España, 2026. Ambos sexos



Tasas por 100.000 habitantes y año.

Esta tabla sólo incluye los principales tipos de cáncer que se presentan en ambos sexos. Por lo tanto no incluye: próstata, testículo, mama, cuello uterino, cuerpo uterino y ovario. Aunque en la mama masculina también se desarrollan y diagnostican cánceres, este tipo de cáncer es muy infrecuente por lo que los cánceres de la mama masculina se incluyen en la categoría "Otros".

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Tabla 4. Proyecciones del número de casos incidentes de cáncer, la tasa específica por edad (TEE) y la tasa truncada (TT) para tres grupos de edad (0-44, 45-64 y 65+ años) por tipo de cáncer en hombres. España, 2026

HOMBRES	0-44			45-64			65+		
	N	TEE	TTR	N	TEE	TTR	N	TEE	TTR
Labio, cav. oral y faringe	140	1,1	1,1	2.160	28,3	28,4	2.970	64,1	64,5
Esófago	32	0,3	0,3	733	9,6	9,7	1.095	23,7	23,7
Estómago	120	1,0	0,9	1.303	17,1	17,2	2.985	64,5	65,1
Colon	244	2,0	1,9	4.674	61,3	61,8	12.880	278,2	280,8
Recto	172	1,4	1,3	3.018	39,5	39,9	5.489	118,6	119,2
Hígado	74	0,6	0,6	2.004	26,3	26,5	3.228	69,7	69,8
Vesícula biliar	11	0,1	0,1	265	3,5	3,5	970	21,0	21,2
Páncreas	66	0,5	0,5	1.580	20,7	20,9	3.613	78,0	78,8
Laringe	23	0,2	0,2	1.265	16,6	16,7	1.515	32,7	32,7
Pulmón	185	1,5	1,4	6.514	85,4	86,1	16.380	353,8	356,2
Melanoma de piel	431	3,5	3,4	1.531	20,1	20,1	2.047	44,2	44,9
Próstata	30	0,2	0,2	9.776	128,1	129,9	25.027	540,6	543,2
Testículo	1359	11,0	10,7	293	3,8	3,8	53	1,1	1,1
Riñón (sin pelvis)	209	1,7	1,6	2.771	36,3	36,5	3.284	70,9	71,2
Vejiga urinaria	211	1,7	1,6	5.135	67,3	68,1	14.150	305,6	308,0
Encéfalo y sistema nervioso	318	2,6	2,6	964	12,6	12,7	1.230	26,6	26,7
Tiroides	384	3,1	3,0	834	10,9	10,9	520	11,2	11,2
Linfoma de Hodgkin	515	4,2	4,0	294	3,9	3,8	244	5,3	5,3
Linfomas no hodgkinianos	674	5,5	5,3	2.671	35,0	35,1	3.557	76,8	77,4
Mieloma	26	0,2	0,2	555	7,3	7,3	1.293	27,9	28,1
Leucemias	511	4,1	4,1	929	12,2	12,2	2.387	51,6	52,4
Otros	438	3,6	3,5	2.470	32,4	32,6	5.936	128,2	130,0
Todos excepto piel no mel.	**6174**	**50,0**	**48,4**	**51.738**	**678,0**	**683,6**	**110.852**	**2.394,3**	**2.411,4**

N: Número absoluto de casos. **TEE**: Tasa específica por edad. **TTR**: Tasa Truncada (ajustada a la población estándar europea)
Tasas por 100.000 habitantes y año.

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Tabla 5. Proyecciones del número de casos incidentes de cáncer, la tasa específica por edad (TEE) y la tasa truncada (TT) para tres grupos de edad (0-44, 45-64 y 65+ años) por tipo de cáncer en mujeres. España, 2026

MUJERES	0-44			45-64			65+		
	N	TEE	TTR	N	TEE	TTR	N	TEE	TTR
Labio, cav. oral y faringe	98	0,8	0,8	1.032	13,3	13,2	1.803	30,2	29,2
Esófago	6	0,1	0,0	115	1,5	1,5	381	6,4	6,3
Estómago	123	1,0	1,0	815	10,5	10,5	2.248	37,7	35,9
Colon	267	2,3	2,1	3.149	40,6	40,4	8.821	147,8	142,2
Recto	149	1,3	1,2	2.017	26,0	25,9	3.251	54,5	53,7
Hígado	22	0,2	0,2	364	4,7	4,7	1.160	19,4	18,9
Vesícula biliar	11	0,1	0,1	231	3,0	3,0	1.068	17,9	16,6
Páncreas	49	0,4	0,4	1.118	14,4	14,3	3.981	66,7	63,4
Laringe	10	0,1	0,1	214	2,8	2,7	179	3,0	3,1
Pulmón	151	1,3	1,2	4.398	56,7	56,3	7.280	122,0	125,6
Melanoma de piel	725	6,1	5,7	1.682	21,7	21,7	1.658	27,8	27,4
Mama	4.079	34,4	31,8	18.478	238,0	237,8	15.760	264,1	263,1
Cérvix Uterino	692	5,8	5,4	1.355	17,5	17,5	713	12,0	12,2
Cuerpo Uterino	226	1,9	1,8	3.339	43,0	42,8	4.194	70,3	71,7
Ovario	226	1,9	1,8	1.804	23,2	23,2	1.737	29,1	29,1
Riñón (sin pelvis)	116	1,0	0,9	1.106	14,2	14,2	1.680	28,2	28,1
Vejiga urinaria	81	0,7	0,6	1.268	16,3	16,2	3.083	51,7	50,9
Encéfalo y sistema nervioso	283	2,4	2,4	656	8,4	8,4	1.222	20,5	20,3
Tiroides	1.415	11,9	11,2	2.304	29,7	29,7	1.222	20,5	21,7
Linfoma de Hodgkin	402	3,4	3,2	164	2,1	2,1	173	2,9	2,9
Linfomas no hodgkinianos	419	3,5	3,4	1.900	24,5	24,4	2.980	49,9	49,7
Mieloma	15	0,1	0,1	382	4,9	4,9	1.255	21,0	20,4
Leucemias	290	2,4	2,5	650	8,4	8,3	1.880	31,5	30,4
Otros	402	3,4	3,3	1.874	24,1	24,0	4.718	79,1	73,2
Todos excepto piel no mel.	**10.258**	**86,4**	**81,1**	**50.415**	**649,5**	**647,8**	**72.446**	**1.214,2**	**1.196,1**

N: Número absoluto de casos. **TEE**: Tasa específica por edad. **TTR**: Tasa Truncada (ajustada a la población estándar europea)
Tasas por 100.000 habitantes y año.

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Tabla 6. Proyecciones del número de casos incidentes de cáncer, la tasa específica por edad (TEE) y la tasa truncada (TT) para tres grupos de edad (0-44, 45-64 y 65+ años) por tipo de cáncer en el conjunto de ambos sexos. España, 2026

AMBOS SEXOS	0-44			45-64			65+		
	N	TEE	TTR	N	TEE	TTR	N	TEE	TTR
Labio, cav. oral y faringe	238	1,0	0,9	3.192	20,7	20,8	4.773	45,0	46,9
Esófago	39	0,2	0,1	848	5,5	5,6	1.476	13,9	15,0
Estómago	244	1,0	1,0	2.118	13,8	13,8	5.233	49,4	50,5
Colon	511	2,1	2,0	7.823	50,8	51,1	21.701	204,8	211,5
Recto	322	1,3	1,3	5.035	32,7	32,9	8.740	82,5	86,4
Hígado	96	0,4	0,4	2.368	15,4	15,6	4.388	41,4	44,4
Vesícula biliar	22	0,1	0,1	496	3,2	3,2	2.038	19,2	18,9
Páncreas	114	0,5	0,4	2.698	17,5	17,6	7.593	71,7	71,1
Laringe	33	0,1	0,1	1.479	9,6	9,7	1.694	16,0	17,9
Pulmón	336	1,4	1,3	10.912	70,9	71,2	23.660	223,3	240,9
Melanoma de piel	1.156	4,8	4,6	3.213	20,9	20,9	3.704	35,0	36,2
Mama	4.079	34,4	31,8	18.478	238,0	237,8	15.760	264,1	263,1
Cérvix Uterino	692	5,8	5,4	1.355	17,5	17,5	713	12,0	12,2
Cuerpo Uterino	226	1,9	1,8	3.339	43,0	42,8	4.194	70,3	71,7
Ovario	226	1,9	1,8	1.804	23,2	23,2	1.737	29,1	29,1
Próstata	30	0,2	0,2	9.776	128,1	129,9	25.027	540,6	543,2
Testículo	1.359	11,0	10,7	293	3,8	3,8	53	1,1	1,1
Riñón (sin pelvis)	324	1,3	1,3	3.877	25,2	25,3	4.964	46,8	49,7
Vejiga urinaria	292	1,2	1,1	6.404	41,6	42,1	17.233	162,6	179,5
Encéfalo y sistema nervioso	601	2,5	2,5	1.620	10,5	10,5	2.452	23,1	23,5
Tiroides	1.799	7,4	7,1	3.138	20,4	20,3	1.742	16,4	16,4
Linfoma de Hodgkin	916	3,8	3,6	458	3,0	3,0	416	3,9	4,1
Linfomas no hodgkinianos	1.093	4,5	4,3	4.571	29,7	29,7	6.537	61,7	63,5
Mieloma	42	0,2	0,2	936	6,1	6,1	2.548	24,0	24,3
Leucemias	801	3,3	3,3	1.579	10,3	10,3	4.266	40,3	41,4
Otros	840	3,5	3,4	4.343	28,2	28,3	10.654	100,5	101,6
Todos excepto piel no mel.	**16.432**	**67,8**	**64,7**	**102.154**	**663,6**	**665,7**	**183.298**	**1.729,8**	**1.803,8**

N: Número absoluto de casos. **TEE**: Tasa específica por edad. **TTR**: Tasa Truncada (ajustada a la población estándar europea)
Tasas por 100.000 habitantes y año.

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 8. Número de casos incidentes de cáncer por grandes grupos de edad (0-44, 45-64 y 65+ años) por tipo de cáncer. Hombres. España, 2026



Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 9. Número de casos incidentes de cáncer por grandes grupos de edad (0-44, 45-64 y 65+ años) por tipo de cáncer. Mujeres. España, 2026



Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 10. Número de casos incidentes de cáncer por grandes grupos de edad (0-44, 45-64 y 65+ años) por tipo de cáncer. Ambos sexos. España, 2026



Fuente: Red Española de Registros de Cáncer

Figura 11. Probabilidad (%) de desarrollar un cáncer (excluidos los tumores cutáneos no melanoma) según la edad por sexo en España el año 2026



Tabla 7. Tasas estimadas de incidencia de cáncer ajustadas a la población estándar europea de 2013, por tipo de cáncer y sexo. España, 2016 y 2026

	HOMBRES		MUJERES	
TIPO TUMORAL	**2016**	**2026**	**2016**	**2026**
Labio, cavidad oral y faringe	24,8	20,7	8,2	9,6
Esófago	8,7	7,3	1,3	1,6
Estómago	24,2	17,8	12,1	10,3
Colon	78,1	72,1	41,7	39,6
Recto	40,2	34,5	19,5	18,0
Hígado	21,6	20,9	5,9	5,0
Vesícula biliar	6,6	5,1	4,8	4,1
Páncreas	19,6	21,2	14,7	16,4
Laringe	15,0	10,9	1,4	1,4
Pulmón	110,2	93,0	26,4	40,0
Melanoma piel	13,8	15,9	14,2	14,2
Mama			121,1	131,5
Cérvix Uterino			8,8	10,0
Cuerpo Uterino			25,8	26,3
Ovario			13,1	12,8
Próstata	152,5	140,5		
Testículo	5,8	7,0		
Riñón (sin pelvis)	22,3	24,4	9,3	9,8
Vejiga urinaria	80,2	79,0	14,8	14,6
Encéfalo y SNC	6,0	9,9	7,3	7,5
Tiroides	5,0	6,7	15,3	18,2
Linfoma de Hodgkin	3,6	4,2	2,6	2,9
Linfomas no hodgkinianos	25,9	27,2	18,3	18,0
Mieloma	9,0	7,5	6,5	5,3
Leucemias	18,7	15,7	10,6	9,5
Otros	39,1	35,8	24,4	22,4
Todas excepto piel no melanoma	**730,9**	**677,5**	**418,6**	**437,5**

Anexo.

Tabla 8. Tipos tumorales estudiados

TIPO TUMORAL	ICD-10
Labio, cavidad oral y faringe	C00-14
Esófago	C15
Estómago	C16
Colon	C18
Recto y ano	C19-21
Hígado	C22
Vesícula y vías biliares	C23-24
Páncreas	C25
Laringe	C32
Pulmón	C33-C34
Melanoma de piel	C43
Mama (solamente mujer)	C50
Cuello uterino	C53
Cuerpo uterino	C54
Ovario	C56
Próstata	C61
Testículo	C62
Riñón	C64
Vejiga urinaria	C67 + (D09.0) (*)
Encéfalo y SNC	C70-72
Tiroides	C73
Linfoma de Hodgkin	C81
Linfomas no hodgkinianos	C82-86, C88
Mieloma	C90
Leucemias	C91-95
Otros	**(**)**
Todos, excepto de piel no melanoma	**C00-96 (excepto C44)**

(*) Se incluyen también el código D09.0 correspondiente a tumor de vejiga urinaria *in situ*.

(**) C17: Intestino delgado, C26: Órganos digestivos no especificados, C30-31: Cavidad nasal y senos, C37: Timo, C38: Corazón, mediastino y pleura, C39: Órganos torácicos mal definidos, C40-41: Hueso y cartílagos, C45: Mesotelioma, C46 Sarcoma de Kaposi, C47 y C49: Tejidos blandos, C48 Peritoneo, C50: Mama (solamente hombre), C51: Vulva, C52: Vagina, C55: Útero SAI, C57: Otros órganos genitales femeninos y no especificados, C58: Placenta, C60: Pene, C63: Otros órganos genitales masculinos y no especificados, C65: Pelvis renal, C66: Uréter, C68: Otros órganos urinarios y no especificados, C69: Ojo, C74: Glándula suprarrenal, C75: Otras glándulas endocrinas y de estructuras afines, C76: Mal definido, C80: Primario desconocido.

Tabla 9. Pirámide mundial estándar

	1960	
Edad	**Hombres**	**Mujeres**
0	2400	2400
1-4	9600	9600
5-9	10000	10000
10-14	9000	9000
15-19	9000	9000
20-24	8000	8000
25-29	8000	8000
30-34	6000	6000
35-39	6000	6000
40-44	6000	6000
45-49	6000	6000
50-54	5000	5000
55-59	4000	4000
60-64	4000	4000
65-69	3000	3000
70-74	2000	2000
75-79	1000	1000
80-84	500	500
85+	500	500

Tabla 10. Pirámides estándar europeas

	1976		2013	
Edad	**Hombres**	**Mujeres**	**Hombres**	**Mujeres**
0	1600	1600	1000	1000
1-4	6400	6400	4000	4000
5-9	7000	7000	5500	5500
10-14	7000	7000	5500	5500
15-19	7000	7000	5500	5500
20-24	7000	7000	6000	6000
25-29	7000	7000	6000	6000
30-34	7000	7000	6500	6500
35-39	7000	7000	7000	7000
40-44	7000	7000	7000	7000
45-49	7000	7000	7000	7000
50-54	7000	7000	7000	7000
55-59	6000	6000	6500	6500
60-64	5000	5000	6000	6000
65-69	4000	4000	5500	5500
70-74	3000	3000	5000	5000
75-79	2000	2000	4000	4000
80-84	1000	1000	2500	2500
85+	1000	1000	2500	2500

Metodología estadística

1. Para la mayoría de tipos tumorales, el número de casos incidentes del año 2026, se estimó aplicando a la mortalidad nacional estimada para dicho año, las razones incidencia/mortalidad (RIM) estimadas mediante tres pasos.

   Estimación de la mortalidad: Mediante un análisis edad-periodo-cohorte del periodo 2004-2023, se estimó, para cada combinación tipo tumoral y sexo, las tasas de mortalidad por grupo de edad del periodo 2024-2028 de toda España. El número de defunciones del año 2026 se estimó aplicando las tasas de mortalidad del año 2026 a la población estimada de ese mismo año, asumiendo que las tasas de mortalidad del año 2026 son las mismas que las del periodo 2024-2028.

   Estimación de las razones incidencia/mortalidad: La estimación de las RIM se realizó a partir de los datos de incidencia y mortalidad de las provincias que disponían de datos de incidencia aportados por registros de cáncer. Para cada combinación tipo tumoral y sexo se estimaron las RIM, mediante un modelo lineal generalizado mixto donde el término independiente eran los casos incidentes, el término de desplazamiento el número de defunciones y los términos independientes el año de diagnóstico, la edad y la provincia de residencia, esta última como un efecto aleatorio. La estimación de los parámetros de los modelos se realizó en base a una aproximación estadística bayesiana empleando métodos de simulación de tipo Monte Carlo y cadenas de Markov.

   Estimación de la incidencia: El número de casos incidentes del año 2026 se estimó aplicando a cada combinación tipo tumoral, sexo y edad de la mortalidad de dicho año, los valores del modelo estimado para la RIM.

2. En combinaciones de tipo tumoral y sexo con poca casuística de mortalidad y no idoneidad en la aplicación de modelos RIM, se aplicó un modelo frecuentista que consistía en, calcular el porcentaje anual de cambio (PAC) a partir de un modelo loglineal, en el período 2010-2019, que estimó la tasa de incidencia a partir de la edad y del año de diagnóstico y, a partir de ello, estimar las tasas específicas por edad de los años posteriores al último periodo de incidencia conocida (2015-2019) mediante la aplicación del PAC sobre las tasas específicas por edad del año anterior. El número de casos del año 2026 se determinó a partir de aplicar las tasas específicas por edad de este año a la población española estimada del año 2026.
   Los tipos tumorales a los que se aplicó este modelo frecuentista son: Próstata, Testículo, Vejiga urinaria, Tiroides y Linfoma de Hodgkin en hombres, y Laringe, Mama, Cuerpo Uterino, Encéfalo y sistema nervioso, Tiroides, Linfoma de Hodgkin y Leucemias en mujeres.

Como que en cada tipo tumoral se ha aplicado el método estadístico más conveniente con la finalidad de que cada valor sea lo más preciso posible, las tablas 1, 2 y 3 presentan los intervalos de credibilidad o de confianza al 95% según la metodología utilizada para cada uno de los cinco parámetros presentados.

Red Española
de Registros
de Cáncer