



## **Recomanació vacunació contra la COVID-19**

### **Campanya 2025-2026**

El virus del SARS-CoV-2 ha mostrat la capacitat de propagar-se tot l'any.

L'objectiu d'administrar aquesta vacuna és reforçar la protecció immunitària contra les variants actuals i reduir complicacions, hospitalitzacions i mortalitat en les persones més vulnerables.

#### **Població diana (grups de risc)**

#### **A. Persones amb major risc de complicacions o quadres greus en cas de patir la infecció**

1. Població a partir de 70 anys.
2. Persones a partir de 5 anys que estiguin en:
  - centres de discapacitat
  - residències de gent gran
  - institucions tancades
3. Població a partir dels 6 mesos d'edat amb afeccions amb risc important de malaltia greu:
  - trasplantament de progenitors hematopoètics
  - algunes immunodeficiències primàries i adquirides
  - en tractament amb teràpies immunosupressores\*
  - malalties cròniques cardiovasculars greus
  - malalties cròniques respiratòries greus (incloent-hi asma greu)
  - malalties neurològiques o neuromusculars greus
  - càncer i hemopaties malignes
4. Persones a partir de 12 anys que pertanyen a grups de risc:
  - diabetis *mellitus* i síndrome de Cushing
  - obesitat mòrbida (índex de massa corporal  $\geq 40$  en adults,  $\geq 35$  en adolescents o  $\geq 3$  DS en infants)
  - malalties cròniques cardiovasculars (entre les quals, HTA amb afectació cardíaca), neurològiques o respiratòries (incloent-hi displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma)
  - malaltia renal crònica en estadis 3, 4 i 5; síndrome nefròtica

- hemoglobinopaties i anèmies o hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics, així com receptors d'hemoderivats i transfusions múltiples
- asplènia o disfunció esplènica greu
- malaltia hepàtica crònica
- malalties neuromusculars greus
- trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres

5. Dones embarassades (en qualsevol trimestre de gestació).

Especial vulnerabilitat: immunosupressió (incloent-hi les immunodeficiències primàries i l'originada per la infecció per VIH o per fàrmacs\*, així com en els receptors de trasplantaments, CAR-T i dèficit de complement). \**Vegeu l'annex 2.*

## **B. Grups amb accés a la vacunació per a protecció personal i per reduir la transmissió**

També tenen accés a la vacunació:

1. Personal que treballa en centres sanitaris o sociosanitaris.
2. Convivents o cuidadors de persones en risc.

### **Recomanacions**

Es recomana la vacunació contra la COVID-19 en la població diana independentment del nombre de dosis rebudes anteriorment i del nombre i la gravetat d'infeccions prèvies, ja que la protecció adquirida va disminuint progressivament a mesura que sorgeixen noves variants.

Les agendes per vacunar-se estaran disponibles des del 13 d'octubre, coincidint amb la campanya de la grip.

No obstant això, en qualsevol moment de l'any es poden vacunar les persones que pertanyen als grups diana i a les quals no s'hagi administrat encara la vacuna actualitzada amb la nova variant del virus (sempre que es respecti l'interval de tres mesos entre dosis prèvies o infecció).