



Manual bàsic de la vacunació de la grip

Campanya 2025-2026

V.1 (28 de setembre de 2025)

<i>Elaboració</i>	<i>Revisió</i>	<i>Aprovació</i>
Servei de Prevenció de la Malaltia	Comitè Assessor de Vacunacions de les Illes Balears	Direcció General de Salut Pública
data: setembre de 2025	data: setembre de 2025	data: setembre de 2025

<i>Control de versions</i>		
<i>Versió</i>	<i>Data</i>	<i>Descripció</i>
0	22.09	Inicial
1	28.09	Al·lèrgia greu a l'ou. Precaucions



Índex

1. Introducció	3
2. Població diana	3
3. Cobertura objectiu	6
4. Inici de la campanya	6
5. Vaccins	6
6. Pauta anual de la vacuna antigripal.....	8
7. Aplicacions informàtiques per registrar l'administració dels vaccins	8
8. Conservació i transport dels vaccins.....	9
9. Sol·licitud de vaccins suplementaris	9
10. Notificació de reaccions adverses	10
11. Indicadors.....	11
12. Bibliografia.....	13

Annexos

Annex I. Administració, contraindicacions i precaucions de les vacunes antigripals.....	14
II.1 Consideracions generals.....	14
II.2 Consideracions específiques per a cada vacuna.....	17
Efluelda.....	17
Fluad.....	17
Fluenz.....	18
Flucelvax.....	19
Vaxigrip.....	20
Annex II. Procediment de recepció de vacunes antigripals.....	21



1. Introducció

L'objectiu principal de la vacunació contra la grip és reforçar la protecció de les persones vulnerables per reduir-ne la morbiditat, així com disminuir l'impacte d'aquesta malaltia sobre la capacitat de l'atenció sanitària i sociosanitària.

Aquest manual pretén servir de guia a tot el personal sanitari encarregat de coordinar i executar la campanya de vacunació contra la grip per tal que:

- Identifiqui les poblacions diana per recomanar-los la vacunació.
- Conegui la cobertura que es pretén assolir per tal de promocionar captacions actives.
- Disposi d'un calendari que faciliti la programació de les cites i la sol·licitud de vacunes i les devolucions, en cas necessari.
- Consulti les característiques tècniques dels vaccins.
- Tengui a l'abast les dades de contacte per gestionar la logística i les incidències que puguin sorgir.
- Es gestionin les dosis de les vacunes de forma eficient.

2. Poblacions diana

Aquesta temporada, a causa de l'escassa circulació del virus de la COVID-19, s'ha optat per fer recomanacions de vacunació per separat (vegeu el *Manual de bàsic de vacunació contra la COVID-19*).

A banda de les indicacions independents de vacunació, com a les temporades passades, en totes les persones que són població diana de les dues campanyes es podrà administrar de forma conjunta la vacuna antigripal i la vacuna contra la COVID-19.

**TAULA 1. Població diana que té indicada la vacunació antigripal**

Indicació per edat	Persones de 60 anys o més.
	Població infantil entre 6 i 83 mesos.
	Població internada en centres de discapacitat, residències de grans i institucions tancades.
Indicació en persones en condicions de risc, entre 7 i 59 anys d'edat	Diabetis mellitus i síndrome de Cushing. Obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o 3 desviacions estàndard en infants). Malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, incloses la displàsia broncopulmonar, la fibrosi quística i l'asma. Malaltia renal crònica i síndrome nefròtica. Hemoglobinopaties i anèmies o hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics. Receptors d'hemoderivats i transfusions múltiples. Asplènia o disfunció esplènica greu. Malaltia hepàtica crònica, inclòs l'alcoholisme. Malalties neuromusculars greus. Immunosupressió. Inclou immunodeficiències primàries i la immunosupressió originada per infecció del VIH o per fàrmacs, les persones receptores de trasplantaments i les que presenten dèficit de complement i teràpia CAR-T. Càncer i hemopaties malignes. Malaltia inflammatòria crònica. Trastorns o malalties que comporten disfunció cognitiva (síndrome de Down, demències i altres). Malaltia celíaca. Fístula del líquid cefalorraquidi, implant coclear o en espera d'aquest.



	Persones fumadores.
	Dones embarassades en qualsevol trimestre de la gestació i dones durant el puerperi (fins als 6 mesos després del part i que no s'hagin vacunat durant l'embaràs).
	Persones entre 5 i 18 anys que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
Indicació per tal de reduir l'impacte i mantenir els serveis crítics i essencials	Personal i estudiants de qualsevol centre o establiment sanitari o sociosanitari, incloses les oficines de farmàcia i els centres de menors. Persones que treballen en serveis públics essencials, especialment: forces i cossos de seguretat de tot l'Estat, forces armades, bombers i serveis de protecció civil.
Indicació en persones que poden transmetre la grip a altres amb risc de patir complicacions	Persones que proporcionen cures domiciliàries i convivents amb pacients en afeccions de risc i els cuidadors principals i convivents dels infants menors de 6 mesos.
Indicació per a altres treballadors	Personal d'escoles i centres d'educació infantil (fins als 6 anys).
	Persones amb exposició laboral directa a animals o a les seves secrecions en granges o explotacions avícoles, porcines o de visons o fauna silvestre (aus, senglars o mustèlids), com ara ramaders, veterinaris, treballadors de granges, caçadors, ornitòlegs, agents de medi ambient, personal de zoològics, etc. La finalitat és reduir l'oportunitat d'una infecció concomitant de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació o intercanvi genètic entre els dos virus.



3. Cobertura objectiu

Persones a partir de 60 anys d'edat	75 %
Personal sanitari i sociosanitari	75 %
Altres grups de població diana	60 %

4. Inici de la campanya

- 6 d'octubre de 2025: Campanya de Vacunació Antigripal Escolar (alumnes del segon cicle d'educació infantil), residències de gent gran, persones amb atenció sanitària domiciliària i el personal que treballa en centres i establiments sanitaris i sociosanitaris.
- 13 d'octubre de 2025: la resta de població diana (vegeu la taula 1).

La vacunació estarà disponible fins a final de temporada (31 de març), però s'ha de procurar vacunar el nombre més gran de població possible abans de les vacances de Nadal.

A més a més de les campanyes de vacunació escolar i a residències de gent gran, s'ha de fer captació activa de les persones majors o iguals de 80 anys, persones residents a centres de discapacitat, dones embarassades i menors entre 6 i 83 mesos, que no entren dins la campanya de vacunació escolar.

5. Vaccins

<i>Nom comercial i laboratori</i>	<i>Tipus de vacuna</i>	<i>Població a què va destinada</i>
Efluelda , suspensió injectable en xeringa precarregada Sanofi Aventis	Inactivada trivalent d'alta càrrega antigènica, produïda a partir d'ous embrionats	Persones institucionalitzades de 60 anys i més.
Fluad , suspensió injectable en xeringa precarregada Seqirus	Inactivada trivalent adjuvada, produïda a partir d'ous embrionats	Persones no institucionalitzades de 65 anys i més.



Fluenz , suspensió per a polvorització nasal AstraZeneca	Atenuada trivalent, produïda a partir d'ous embrionats	Infants de 24 a 83 mesos.
Flucelvax , suspensió injectable en xeringa precarregada Seqirus	Inactivada, trivalent, preparada en cultius cel·lulars	Infants de 6 a 23 mesos.
Vaxigrip , suspensió injectable en xeringa precarregada Sanofi Aventis	Trivalent, virus fraccionats, inactivats, produïda a partir d'ous embrionats	Resta de població objecte de vacunació.

Composició de les vacunes

Vacunes trivalents, produïdes a partir d'ous embrionats

<i>Component</i>	<i>Soques de la temporada [soca]</i>
A(H1N1)	A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09
A(H3N2)	A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)
B Victoria	B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)

Vacuna trivalent, produïda a partir de cultius cel·lulars

<i>Component</i>	<i>Soques de la temporada [soca]</i>
A(H1N1)	A/Wisconsin/67/2022(H1N1)pdm09
A(H3N2)	A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)
B Victoria	B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)

A l'annex I hi trobareu un quadre resum amb les dades d'administració, la pauta, les contraindicacions i precaucions de les vacunes antigripals disponibles a les Illes Balears, i també un enllaç a les respectives fitxes tècniques.



6. Pauta anual de la vacuna antigripal

1. La població diana ha de rebre una sola dosi de la vacuna antigripal.
2. Hi ha població infantil o persones adultes amb immunosupressió greu que poden requerir altres pautes:
 - Prematurs de menys de 32 setmanes de gestació entre els 6 i els 24 mesos d'edat i en població entre els 6 i els 8 anys amb afeccions de risc:
 - Si no s'han vacunat mai: 2 dosis (separades entre si almenys per quatre setmanes).
 - Si s'han vacunat prèviament: 1 dosi.
 - Pacients amb antecedents de trasplantament de progenitors hematopoètics, en cas d'administrar 1 dosi abans del sisè mes de postransplantament, es recomana administrar una segona dosi al cap de quatre setmanes (en pacients amb trasplantament d'òrgan sòlid, només es recomana una dosi).

S'ha d'aprofitar qualsevol visita al centre sanitari o als serveis de prevenció de riscos laborals per valorar l'estat general de la vacunació, és a dir, del Calendari sistemàtic de vacunacions i immunitzacions al llarg de tota la vida, i si és possible, completar-lo. En especial, cal revisar:

- Població adulta: tètanus, diftèria, malaltia pneumocòccica invasora, herpes zòster i COVID-19, si escau.
- Població adulta jove: xarampió.

Es recomana coadministrar les vacunes que hi estiguin indicades, especialment les que prevenen malalties respiratòries.

7. Aplicacions informàtiques per registrar l'administració dels vaccins

Aplicació	Personal sanitari
ESIAP (del Servei de Salut)	Punts de vacunació gestionats per personal sanitari d'atenció primària del Servei de Salut. (Per ex.: centres de salut, UBS, vacunació a residències, vacunació escolar, etc.)
	Punts de vacunació dels centres hospitalaris del Servei de Salut (inclosos els seus serveis de prevenció de riscos laborals).



VACUNA, mòdul CAMPANYES (del Servei de Prevenció de la Malaltia de la Direcció General de Salut Pública)	Punts de vacunació gestionats per entitats privades, el personal sanitari de les quals no forma part del Servei de Salut. (P. ex.: els serveis de prevenció de riscos laborals i centres sanitaris de gestió privada)
---	--

VACUNA, mòdul CAMPANYES

Sol·licitud per accedir-hi: vacunes@dgsanita.caib.es. S'hi han d'indicar les dades següents: institució, nom complet, DNI, professió (medicina o infermeria), número de col·legiat, correu electrònic, telèfon de contacte.

Accés en línia: [Aplicació VACUNA, mòdul CAMPANYES](#)

Manual: [Instruccions d'ús del mòdul de registre de vacunes de la campanya de vacunació](#)

8. Conservació i transport de les vacunes antigripals

S'ha de garantir que el transport i la conservació es realitzin a una temperatura d'entre 2 °C i 8 °C i, a més, protegides de la llum. No es poden congelar.

Annex II: Procediment de recepció de vacunes antigripals (Laboratoris farmacèutics-Centres de Salut d'Atenció Primària). Per a més informació, clicau l'enllaç següent: [Conservació i maneig de les vacunes](#).

9. Sol·licitud de vaccins suplementaris

En cas de necessitar més dosis després de la primera entrega, s'han de sol·licitar al centre de distribució que pertoqui. A la taula següent s'indica quin és el centre de distribució que correspon a cada punt de vacunació en funció del tipus de vacuna i illa.

**Centres de distribució. Contactes***Vacunes antigripals*

<i>Illa</i>	<i>Centre</i>	<i>Telèfon</i>	<i>Correu electrònic / Fax</i>
Mallorca, atenció primària	Son Pisà (CS /UBS/ PVM)	682 62 56 94 Ext. 90745 971 28 38 26	Georgina Ponsa Mir (gponsa@ibsalut.es / gapm.magatzem.vacunes@ibsalut.es) La comanda es fa pel formulari Forms que s'envia des de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca cada dijous. El repartiment es fa setmanal, cada dimarts. Per a comandes urgents, s'ha d'emprar també el Forms de comandes urgents.
Mallorca, altres centres de gestió privada	DG de Salut Pública, Vacunes	971 17 66 20	vacunaciogrip@dgsanita.caib.es
Menorca	Centre Insular de Menorca	971 17 73 33	vacunesmenorca@dgsanita.caib.es 971 17 69 14
Eivissa	Centre Insular d'Eivissa i Formentera	971 17 70 67	vacuneseivissa@dgsanita.caib.es 971 17 68 61

Canvis de vacuna entre centres de l'IB-SALUT

Si, per alguna circumstància excepcional, és necessari demanar una vacuna a un altre centre de salut, s'ha d'assegurar que el transport compleix les condicions tècniques requerides per a cada una de les vacunes. El centre que les cedeix ho ha de comunicar immediatament al centre de distribució que li pertorqui. La vacuna no ha de retornar al centre que l'ha cedida.

10. Notificació de sospita de reaccions adverses

S'ha de notificar qualsevol sospita de reacció adversa de la vacuna. La notificació es pot fer de les maneres següents:



- En l'entorn del Servei de Salut: des d'RELE/eSIAP, fent clic en [IBNotificaram](#) es genera i s'emplenen la majoria de les dades necessàries de forma automàtica.
- Fora de l'entorn del Servei de Salut: a partir de l'enllaç [IBNotificaram](#)

També es pot fer la notificació en el [Sistema Espanyol de Farmacovigilància](#).

11. Indicadors de cobertura per a l'estudi dels resultats de la Campanya de Vacunació contra la Grip. Temporada 2025-2026

<i>Població infantil entre 6 i 83 mesos</i>
Població diana: entre 6 i 83 mesos d'edat.
— De 6 a 23 mesos
— De 24 a 59 mesos
— De 60 a 83 mesos
Nre. de vacunats entre 6 i 83 mesos.
— De 6 a 23 mesos
— De 24 a 59 mesos
— De 60 a 83 mesos
Cobertura de vacunació antigripal en persones entre 6 i 83 mesos.
— De 6 a 23 mesos
— De 24 a 59 mesos
— De 60 a 83 mesos
<i>Població infantil entre 1 i 5 anys</i>
Població diana: entre 1 i 5 anys d'edat.
Nre. de vacunats entre 1 i 5 anys d'edat.
Cobertura de vacunació antigripal en persones entre 1 i 5 anys d'edat.
<i>Entre 6 i 59 anys en afeccions de risc</i>
Població diana: població amb afeccions de risc entre 5 i 59 anys.
Nre. de vacunats amb afeccions de risc entre 5 i 59 anys.
Cobertura de vacunació antigripal en persones de 5 a 59 anys en condicions de risc.
<i>Dones embarassades</i>
Població diana: dones embarassades durant la campanya.
Nre. de dones embarassades durant la campanya, vacunades.
Cobertura de vacunació antigripal en dones embarassades durant la campanya.

**Personal sanitari**

Població diana: personal que treballa al Servei de Salut de les Illes Balears.

Nre. de vacunats del personal que treballa al Servei de Salut de les Illes Balears.

Cobertura de vacunació antigripal del personal que treballa al Servei de Salut de les Illes Balears.

Població de 60 anys d'edat i més

Població diana: de 60 anys d'edat o més.

— De 60 a 64 anys

— De 65 a 69 anys

— De 70 a 74 anys

— De 75 a 79 anys

— Població de 80 anys d'edat o més

Nre. de vacunats de 60 anys d'edat o més.

— De 60 a 64 anys

— De 65 a 69 anys

— De 70 a 74 anys

— De 75 a 79 anys

— Població de 80 anys d'edat o més

Cobertura de vacunació antigripal en persones de 60 anys d'edat o més.

— De 60 a 64 anys

— De 65 a 69 anys

— De 70 a 74 anys

— De 75 a 79 anys

— Població de 80 anys d'edat o més

Població institucionalitzada

Població diana: població institucionalitzada.

Nre. de persones vacunades entre la població institucionalitzada.

Cobertura de vacunació antigripal en població institucionalitzada.

TOTAL

Població diana.

Nre. de persones vacunades contra la grip.

Cobertura de vacunació antigripal.



12. Bibliografia

- Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Madrid: Ministeri de Sanitat. Recomendaciones de vacunación frente a gripe. Temporada 2025-26, a Espanya. Madrid: Ministeri de Sanitat, 3 de juliol de 2025.
<https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/enfermedades/profesionales/gripe.htm> [consulta: 05/09/2025].
- Fitxa tècnica o resum de les característiques tècniques del producte. Efluelda. Madrid: Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, novembre de 2024. https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/89951/FT_89951.html [consulta: 05/09/2025].
- Fitxa tècnica o resum de les característiques tècniques del producte. Fluad. Madrid: Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, novembre de 2024. <https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=1241878001> [consulta: 05/09/2025].
- Fitxa tècnica o resum de les característiques tècniques del producte. Flucelvax. Madrid: Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, novembre de 2024. <https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=1241878001> [consulta: 05/09/2025].
- Fitxa tècnica o resum de les característiques tècniques del producte. Fluenz suspensió per a polvorització nasal. Madrid: Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, 3 de juny de 2024.
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1241879001/FT_1241879001.html [consulta: 05/09/2025].
- Fitxa tècnica o resum de les característiques tècniques del producte. Vaxigrip. Madrid: Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, novembre de 2024. https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/89951/FT_89951.html [consulta: 05/09/2025].
- Al·lèrgia infantil. Pauta d'actuació per administrar la vacuna antigripal a infants amb al·lèrgia a ou. Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Asma i Al·lèrgologia Pediàtrica (SEICAP), octubre de 2020. <https://seicap.es/documentos-general/vacunacion-antigripal-en-alergia-a-huevo/> [consulta: 05/09/2025].
- Preguntes i respostes sobre vacunació davant la grip en la temporada 2025-2026. Madrid: Ministeri de Sanitat, 23 de juliol de 2025.
https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/gripe_covid19/docs/recomendacionesVacunacionGripe_2025_2026.pdf [consulta: 05/09/2025].



Annex I. Administració, contraindicacions i precaucions de les vacunes antigripals

I.1 Consideracions generals

Contraindicacions

- Infants menors de 6 mesos.
- Antecedent de reacció anafilàctica o al·lèrgica greu a una dosi anterior d'una vacuna antigripal o a algun dels seus components. És una contraindicació permanent per tornar a administrar aquesta vacuna o qualsevol altra vacuna que contingui el component en qüestió.

Al·lèrgia a l'ou

Les vacunes antigripals disponibles a les Illes Balears poden contenir traces d'ou, ja que contenen virus de la grip cultivats en ous de gallina embrionats, excepte la vacuna Flucelvax (destinada a infants de 6 a 23 mesos), que conté virus de la grip que provenen de cultius cel·lulars. Per aquest motiu, les fitxes tècniques de les vacunes indiquen: «Contraindicada en persones amb hipersensibilitat a qualsevol principi actiu, excipient de la vacuna o a possibles traces, com ara: ovoalbúmina».

A les taules de l'apartat I.2, «Consideracions específiques per a cada vacuna», consten les contraindicacions de cadascuna de les fitxes tècniques.

D'altra banda, cal tenir en compte que el Ministeri de Sanitat, des de l'any 2019, fa la recomanació següent: «Tot i que algunes vacunes contenen traces residuals d'ovoalbúmina, la presència d'aquesta no suposa cap contraindicació en les persones amb història d'al·lèrgia per exposició a l'ou. Infants i adults poden rebre vacunes contra la grip sense precaucions especials, tant les vacunes inactivades com les atenuades. Les precaucions han de ser similars a les que es prenen davant l'administració de qualsevol altra vacuna. En cas d'haver presentat reaccions al·lèrgiques greus, ha de vacunar personal amb experiència i amb supervisió durant trenta minuts després de l'administració».

La Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Asma i Al·lèrgologia Pediàtrica (SEICAP) fa les recomanacions següents (octubre, 2020) per a la vacunació antigripal infantil:

1. Contraindicació de la vacuna antigripal en infants amb reaccions anafilàctiques greus després de l'administració d'una dosi prèvia de vacuna antigripal.



2. En cas de reaccions no greus després de la ingesta d'ou, es pot vacunar amb la vacuna recomanada, amb les recomanacions següents:
 - a) La vacuna antigripal es pot administrar al centre habitual.
 - b) No és necessari el fraccionament de la dosi de la vacuna per seguretat, i es pot administrar en una dosi única.
 - c) Es recomana un període d'observació de trenta minuts després de l'administració.
3. En cas d'història de reaccions anafilàctiques després de la ingesta d'ou, es pot fer la vacunació antigripal amb la vacuna recomanada amb les especificacions següents:
 - a) La vacuna antigripal es pot administrar al seu centre habitual, no és necessari fer-ho en un centre hospitalari.
 - b) La vacunació l'ha de supervisar personal sanitari amb capacitat per reconèixer i tractar reaccions al·lèrgiques greus.
4. Els infants que, per diverses causes, no han iniciat en la seva dieta la ingesta d'ou poden ser vacunats amb la vacuna antigripal en el seu centre habitual de vacunació.
5. Recomanacions generals:
 - La vacunació antigripal d'infants amb al·lèrgia a l'ou, com amb qualsevol altra vacuna, requereix observació posterior durant trenta minuts.
 - El centre de vacunació ha d'estar equipat amb els mitjans habituals de reanimació cardiopulmonar.

Precaucions

- Les vacunes no s'han d'administrar per via intravascular, en cap circumstància.
- En cas de coadministració de vacunes injectables, cada una s'ha d'administrar en extremitats diferents.
- En pacients febrils o amb infecció aguda, de moderada a greu, s'ha d'ajornar l'administració de la vacuna. No és necessari posposar la cita en cas de processos lleus.
- Infants de fins a 35 mesos amb antecedents de convulsions febrils: consultau l'equip de pediatria.
- Les persones amb alteracions de la coagulació, excepte criteri mèdic específic, es poden vacunar. S'ha de tenir en compte que hi pot haver un risc major de sagnat després d'una injecció intramuscular. Per afavorir l'hemostàsia s'ha d'emprar una agulla fina, entre 25 i 23G de calibre, i fer pressió ferma sobre la



zona de punció després de l'administració almenys dos minuts (NO s'ha de fregar, NO s'ha de fer massatge). Sempre s'ha de considerar la possibilitat d'aparició d'un hematoma a la zona d'injecció. En el cas de pacients hemofílics, la vacunació s'ha d'administrar tan ràpidament com sigui possible després de rebre la teràpia substitutiva amb factors de coagulació.

- Les persones en tractament crònic amb anticoagulants que mantinguin controlat i estable l'INR en rang terapèutic poden rebre la vacunació intramuscular sense problemes. En cas de dubte, s'ha de consultar el personal clínic responsable del seu tractament.
- Abans d'administrar la vacuna: entebeiïu-la a temperatura ambient. Agitau-la amb suavitat. Comprovau-ne l'aspecte.
- S'han de rebutjar si: presenten partícules en suspensió, hi ha variació de color o s'han congelat.



I.2 Consideracions específiques per a cada vacuna

<i>Població diana</i>	<i>Vacuna</i>	<i>Volum (ml)</i>	<i>Via i lloc d'administració</i>	<i>Contraindicacions i precaucions</i>	<i>Excipients</i>	<i>Fitxes tècniques</i>
Persones de 60 anys o més, institucionalitzades	Efluelda	0,5	Intramuscular, zona deltoïdal. No administreu a la zona glútia o en àrees on hi pot haver un tronc nerviós central.	Contraindicada en persones amb hipersensibilitat a qualsevol principi actiu, excipient de la vacuna o a possibles traces, com ara: ovoalbúmina, proteïnes de pollastre i formaldehid. No indicada en menors de 18 anys ni en dones en edat fèrtil, embarassades o en lactància.	Solució isotònica de clorur de sodi tamponada amb fosfat de sodi. Octoxinol-9.	FT EFLUELDA. AEMPS.
Persones a partir de 65 anys, no institucionalitzades	Fluad	0,5	Intramuscular, zona deltoïdal.	Contraindicada en persones amb hipersensibilitat a qualsevol principi actiu, excipient de la vacuna o a possibles traces, com ara: ovoalbúmina, kanamicina i sulfat de neomicina, formaldehid, bromur de cetiltrimetilamoni (CTAB) i hidro cortisona. No indicada en menors de 18 anys ni en dones en edat fèrtil, embarassades o en lactància.	Clorur de sodi, clorur de potassi, dihidrogenofosfat de potassi, fosfat disòdic dihidrat, clorur de magnesi hexahidratat, clorur de calci dihidrat. Aigua per a injectables.	FT FLUAD. AEMPS



<i>Població diana</i>	<i>Vacuna</i>	<i>Volum (ml)</i>	<i>Via</i>	<i>Fitxes tècniques</i>
Infants de 24 a 83 mesos	Fluenz, suspensió per a polvorització nasal	0,2	Intranasal 0,1 ml a cada fossa	FT FLUENZ. AEMPS

<i>Contraindicacions</i>	<i>Precaucions</i>	<i>Excipients</i>
<u>Hipersensibilitat</u> als principis actius o algun dels excipients o possible residu vestigial (gentamicina). <u>Immunodeficiència clínica per afeccions o per tractaments amb immunosupressors</u> com leucèmies agudes i cròniques, limfoma, infecció simptomàtica per VIH, deficiències immunitàries cel·lulars i <u>dosis elevades de corticoesteroides</u>. <u>Tractament amb salicilats, tant per via sistèmica com tòpica</u>, per l'associació de la síndrome de Reye amb els salicilats i la infecció per soques salvatges de virus gripal. NO CONTRAINDICAT: infecció asimptomàtica per VIH, tractament amb corticoesteroides tòpics, inhalats o sistèmics a dosis baixes o corticoides com a tractament substitutiu (p. ex. insuficiència suprarenal).	No s'ha d'administrar en infants amb asma greu o que presentin sibilàncies actives en l'actualitat. Posposar la vacunació si hi ha una malaltia febril aguda greu o infecció aguda (no cal si la infecció és lleu o la febre és baixa). Posposar en cas d'obstrucció nasal molt important (no cal en presència de símptomes lleus per refredat comú sense obstrucció nasal). En cas d'haver presentat <u>reacció al·lèrgica greu a l'ou (ex. anafilaxi)</u> o a les proteïnes d'aquests es realitzarà la vacunació per personal amb experiència i supervisió durant 30 minuts després de l'administració. Els infants vacunats han d'intentar evitar el contacte estret amb les persones greument immunodeprimides durant 1-2 setmanes. Si això no és possible, s'ha d'avaluar el risc de transmissió del virus vacunal davant el risc d'adquirir i transmetre soques salvatges del virus influença.	Sacarosa. Hidrogenfosfat de potassi. Dihidrogenfosfat de potassi. Gelatina. Clorhidrat d'arginina. Monohidrat de glutamat monosòdic. Aigua per a injecció.



<i>Població diana</i>	<i>Vacuna</i>	<i>V (ml)</i>	<i>Via i lloc d'administració</i>	<i>Contraindicacions i precaucions</i>	<i>Excipients</i>	<i>Fitxa tècnica</i>
Infants de 6 a 23 mesos	Flucelvax	0,5	reparada. Intramuscular, zona deltoidal. Els infants petits amb massa muscular insuficient han de ser vacunats a la cara anterolateral de la cuixa.	Contraindicada en persones amb hipersensibilitat a qualsevol principi actiu o excipient de la vacuna o a qualsevol component que pugui estar present en traces residuals: beta- propiolactona, bromur de cetiltrimetilamoni i polisorbat 80.	Clorur de sodi, clorur de potassi, clorur de magnesi hexahidrat, fosfat de disodi dihidrat, fosfat dihidrogen de potassi. Aigua per a preparacions injectables	FI FLUCELVAX. AEMPS



<i>Població diana</i>	<i>Vacuna</i>	<i>V (ml)</i>	<i>Via i lloc d'administració</i>	<i>Contraindicacions i precaucions</i>	<i>Excipients</i>	<i>Fitxa tècnica</i>
Resta de població objecte de vacunació. Embaràs i lactància: es pot administrar durant l'embaràs i la lactància.	Vaxigrip	0,5	Es pot administrar per les vies intramuscular i subcutània. Preferiblement, via intramuscular, zona deltoïdal.	No indicada en menors de sis mesos (1 dosi administrada a la dona embarassada pot protegir els lactants des del naixement fins als 6 mesos d'edat). Contraindicada en persones amb hipersensibilitat a qualsevol principi actiu o excipient de la vacuna o a qualsevol component que pugui estar present en traces, tals com ous (ovoalbúmina, proteïnes de pollastre), neomicina, el formaldehid i octoxinol-9.	Clorur de sodi, clorur de potassi, hidrogenfosfat de sodi dihidrat, fosfat dihidrogen de potassi. Aigua per a preparacions injectables	FI VAXIGRIP. AEMPS



Annex II. Procediment de recepció de vacunes antigripals (laboratoris farmacèutics i centres de salut d'atenció primària)

1. Està previst que les persones responsables de vacunes del Servei de Salut rebin un correu electrònic del Servei Previsió de la Malaltia (vacunaciogrip@caib.es) per informar-les sobre la data d'entrega de les vacunes (primera entrega de la campanya).
2. Entrega: hi ha d'haver una persona del centre que es responsabilitzi de la recepció. Ha de validar de manera immediata que les vacunes arriben en les condicions de transport adequades: temperatura de 2 °C a 8 °C, que no hi ha congelació i protegides de la llum.
 - 2.1. S'ha de comprovar que a cada caixa hi ha indicadors de temperatura (són unes targetes amb cinc finestres numerades que es tenyeixen de manera gradual i irreversible si les vacunes han estat exposades a temperatures superiors a 10 °C). El nombre de finestres tenyides de color es relaciona amb el temps d'exposició a temperatures altes de manera directa. A més, per cada cinc caixes o proporció hi ha d'haver un indicador de congelació.

Vacunes pediàtriques Fluenz (laboratori AstraZeneca): no venen amb indicadors de temperatura, les caps de transport estan validades per mantenir les vacunes entre 2 °C i 8 °C fins a 144 hores. La vacuna ha de ser emmagatzemada immediatament a temperatura entre 2 °C i 8 °C extraient-les de la caps isoterma.
 - 2.2. Si la comanda s'ha rebut amb els indicadors de temperatura i congelació pertinents, si aquests estan activats i no presenten cap incidència, s'han d'emmagatzemar al més aviat possible en una gelera que assegurï una temperatura constant d'entre 2 °C i 8 °C. Cada indicador de temperatura i congelació ha de venir amb les instruccions adjuntes.
 - 2.3 En el cas que es detecti una incidència en la recepció de les vacunes, s'han de posar en quarantena, dins la gelera, i notificar-ho al Servei de Previsió de la Malaltia perquè pugui gestionar la incidència. Contacte: vacunaciogrip@caib.es. Telèfons: 971 17 73 34 i 971 17 73 32.
3. Albarà: pot ser dins el paquet amb les agulles o bé aferrat a la caixa. S'ha d'assegurar que és l'albarà del laboratori farmacèutic (necessari per a la facturació) i no el full del transportista. L'albarà SEMPRE du el nom del laboratori i el nombre de dosis, tal com es veu a la imatge:



sanofi-aventis, S.A.
Josep Pla, nº 2
08019 - BARCELONA
Teléfono: +34 93 485 94 00 Fax: +34 93 485 95 00
C.I.F. ESA08163588

SANOFI

ALBARÁN DE EXPEDICIÓN

Datos comerciales
de fecha
Nº Albarán: 5001432688 28.08.2020
S/ Pedido: E-MAIL 28.08.2020 28.08.2020

Datos Entrega
Cuenta: 100031001
C.I.F. 50711001H
09641085

Datos expedición
Envío por: INTEGRA 2 FRIOFARMA
Medio Transporte: Via aerea
Nº de bultos: 00050 Peso (kg): 165,000
Volumen CM3: 3.222.400,000 Peso Neto(kg): 115,000

Centre que rep les vacunes

Nombre de dosis

Código	Descripción/Lote	Fecha caducidad	% IVA	Unidades	Precio	Importe	Neto
716028	*** SPedidos: 2019/7836, LOTE 2 de fecha *** Nº Ped SAP: 100127827892019/7836, LOTE 2 VXG, QUAD ED ES PR WE (715222) Lote T3J012V 31-07-2008			300	8,50	2.550,00	870,00

3.1. S'ha de comprovar la quantitat de dosis rebudes, el lot i la data de caducitat. Posteriorment, a l'albarà s'ha d'escriure la informació següent:

- Dosis rebudes.
- Temperatura de transport a l'arribada al centre de salut.
- Data i l'hora de recepció de la comanda. Això és especialment important si es reben comandes fora dels horaris establerts.
- Centre de salut i nom i llinatges de la persona que fa la recepció, amb la seva signatura.

En cas de rebre una entrega sense albarà, s'ha d'avisar immediatament el Servei de Prevenció de la Malaltia, als telèfons 971 17 73 34 i 971 17 73 32.

MOLT IMPORTANT: Tramesa de l'albarà

Un cop s'han recepcionat les vacunes, s'ha d'enviar una còpia (o bé una fotografia feta amb un mòbil) de l'albarà amb totes les dates indicades al punt 3.1 al Servei de Prevenció de la Malaltia, al fax 971 17 69 98 o a la bústia vacunaciogrip@caib.es.