



# VACUNACIÓ CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMÀ (VPH)

## Instrucció de la DG Salut Pública per a l'any 2025

Vacuna disponible:  
**GARDASIL 9** suspensió injectable en xeringa precarregada



### VACUNACIÓ SISTEMÀTICA

Nins i nines de 12 anys

**1 DOSI**



### CAPTACIÓ

Homes i dones  
entre 13 i 18 anys  
no vacunats amb cap dosi

**1 DOSI**



### PERSONES EN DETERMINADES SITUACIONS DE RISC

Homes que tenen  
relacions sexuals amb homes  
i persones en situacions de prostitució:

- Fins als 25 anys: **1 DOSI**
- Dels 26 anys als 45: **2 DOSIS**  
(separades entre si almenys 6 mesos)

### PERSONES EN CONDICIONS DE RISC FINS ALS 45 ANYS (inclosos)

Persones que pertanyen als grups següents:  
síndrome WHIM (IDP), infecció VIH  
o trasplantament d'òrgan sòlid  
o de progenitors hematopoètics:

**3 DOSIS**  
**(0,1-2 i 6 MESOS)**

### PERSONES EN CONDICIONS DE RISC

Dones que han rebut tractament per lesió  
intraepitelial d'alt grau de cèrvix (CIN2+):

**3 DOSIS**  
**(0,1-2 i 6 MESOS)**

Preferentment, abans del tractament de la lesió.  
Si no és possible, tan aviat com es pugui  
un cop finalitzat el tractament.

Sempre que coexisteixi una situació  
d'**immunosupressió**, la pauta ha de ser  
de **3 DOSIS**.



Les persones que **anteriorment han  
rebut una o dos dosis** d'una vacuna  
contra el VPH i es troben en situació/  
tenen una condició de risc: s'ha de  
**completar la pauta en funció del grup**  
al que pertanyen.

### ALTRES MESURES DE PREVENCIÓ

Promocionar el **Programa de Detecció Precoç  
de Càncer de Cèrvix** entre les dones de 25 a 65 anys.

Fomentar l'**educació en sexualitat saludable**  
en funció de la població diana a la qual va dirigida  
(adolescents i persones en situacions de risc).

