


# VIRUELA DE LOS MONOS

¿QUÉ ES?



La viruela de los monos es una zoonosis viral (enfermedad que se transmite de los animales a las personas y que puede afectar a las personas).

¿QUÉ SÍNTOMAS?



Entre 6 y 16 días desde el contagio, suele aparecer fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio y ganglios linfáticos inflamados. Entre 1 y 5 días después de la aparición de la fiebre, sale una erupción que habitualmente comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

El virus de la viruela de los monos (monkeypox) se transmite principalmente entre personas mediante el contacto directo con las vesículas o el contacto prolongado y cercano con secreciones respiratorias.

Además, puede transmitirse por contacto directo con objetos contaminados con fluidos corporales de una persona infectada, como ropa de cama o toallas. También se ha documentado la transmisión de madre a hijo y entre parejas sexuales, debido al contacto íntimo durante las relaciones sexuales.



1- Llamar a su centro sanitario.



2-Aislarse en el domicilio y evitar contacto.



3- Cubrir las lesiones.



4-Usar mascarilla quirúrgica.



5- Evitar el contacto con animales silvestres o domésticos y seguir las recomendaciones de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.



6-Seguir las recomendaciones emitidas por la Conselleria de Salud y Consumo.


¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO SÍNTOMAS?

Más información en:  
[www.dgsalut.caib.es](http://www.dgsalut.caib.es)



# VEROLA DELS SIMIS

QUÈ ÉS?



La verola dels simis és una zoonosi viral (malaltia que es transmet dels animals a les persones i que pot afectar les persones).

QUINS SÍMPTOMES?



COM ES TRANSMET?

El virus de la verola dels simis (monkeypox) es transmet principalment entre persones mitjançant el contacte directe amb les vesícules o el contacte prolongat i pròxim amb secrecions respiratòries.

A més, es pot transmetre per contacte directe amb objectes contaminats amb fluids corporals d'una persona infectada, com ara roba de llit o tovalloles. També s'ha documentat la transmissió de mare a fill i entre parelles sexuals, a causa del contacte íntim durant les relacions sexuals.



1-Cridar al seu centre sanitari.



2-Aïllar-se en el domicili i evitar contacte.



3- Cobrir les lesions.



4- Usar màscara quirúrgica.



5- Evitar el contacte amb animals silvestres o domèstics i seguir les recomanacions de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.



6-Seguir les recomanacions emeses per la Conselleria de Salut i Consum.

QUÈ HE DE FER SI TINC SÍMPTOMES?

Més informació en:  
[www.dgsalut.caib.es](http://www.dgsalut.caib.es)

